





Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta


Teorie ploché Země a její místo ve výuce fyziky

Jan Šlégr

28. 8. 2026



Teorie ploché Země



Teorie ploché Země



Kde je na ploché Zemi sluníčko, když nesvítí?

- Varianta A: Slunce funguje jako lampička
- Varianta B: Slunce se od pozorovatele vzdaluje

(každá správná konspirační teorie je vnitřně rozporná!)

Teorie ploché Země



Varianta A: The Final Experiment



- Na ploché Zemi nemůže existovat polární den v Antarktidě
- Pastor Will Duffy oslovil 48 online tvůrců obsahu - 24 zastánců teorie ploché Země a 24 zastánců kulaté Země, aby s ním letěli pozorovat polární den v Antarktidě, nakonec jeli 4+4
- Odcestovali z Chile do tábora Union Glacier v západní Antarktidě, odkud po dobu tří dnů živě vysílali fenomén pólnočního Slunce = polární den



Teorie ploché Země



Varianta B: Slunce se vzdaluje




Teorie ploché Země



- Nikon P1000 (125násobný zoom) údajně dokáže vytáhnout Slunce zpoza horizontu!



Teorie ploché Země



Teorie ploché Země



Flat Earth Toolkit: Simple Experiments to Debunk the Flat-Earth Model

3




Figure 1. Schematic representation of the formation of the Earth's shadow during a lunar eclipse.




Figure 2. Measuring the Earth shadow diameter.

Pomocí Nikonu P1100 jsme 7. září 2025 získali snímky, z nichž plyne $R_E = (6300 \pm 400)$ km. Relativní odchylka je asi 7, odchylka od správné hodnoty cca 2 %.

Teorie ploché Země



ZATMĚNÍ MĚSÍCE PODLE FLAT EARTH NE STÍN – ALE FÁZOVÁ INTERFERENCE V CELESTIÁLNÍM SVĚTELNÉM POLI

Zatmění Měsíce není způsobeno stínem Země. To je zjednodušený a heliocentrický model založený na gravitačním dogmatu.

Ve skutečnosti jde o přirozený jev, který vzniká interakcí **elektromagnetického pole**, **fotonických vrstev atmosféry** a **nebeské světelné mřížky**.



Měsíc se při pohybu nad azimutální mřížkou zraku dostává do oblasti, kde dochází k fázovému posunu a modulaci světelného pole.

Teorie ploché Země



MECHANISMUS: FÁZOVÁ INTERFERENCE A MODULACE SVĚTLA

1. FOTONICKÁ ÚTLUMOVÁ VRSTVA


Nad rovinou existuje polo-transparentní energetická vrstva (firmament), která obsahuje nabitě částice a mikroplazma.



- Tato vrstva může částečně pohlcovat, rozptylovat nebo filtrovat světlo.
- Hustota částic se v průběhu času mění.

2. ELEKTROMAGNETICKÝ FÁZOVÝ POSUN

Sluneční světlo se nešíří přímočaře vakuem, ale prochází polem, které může měnit jeho frekvenci, fázi a amplitudu.




- Změny hustoty náboje vytváří rozdíly ve fázi.
- Dochází k konstruktivní nebo destruktivní interferenci.

3. INTERAKCE S MĚSÍCEM (RESONANCE)

Měsíc není pasivním odrazem světla, ale minerální těleso, které rezonuje s dopadajícími frekvencemi.

Při vstupu do zóny fázového posunu přijímá deformované spektrum světla.



- Některé vlnové délky jsou zrušeny.
- Jiné jsou zesíleny.
- Odrážené světlo se změní.

4. SPEKTRÁLNÍ FILTRACE (PROČ JE MĚSÍC ČERVENÝ)

Během zatmění jsou kratší vlnové délky (modré/fialové) filtrovány polem.

Delší vlnové délky (červené/oranžové) převládají.






Měsíc přechází do nízkofrekvenční rezonanční fáze, proto se jeví červený až tmavě měděný. (Nezpůsobeno atmosférou Země, ale filtrací ve světelném poli.)

Teorie ploché Země



Foucaultovo kyvadlo





Teorie ploché Země



Toroidální model éterové precese (TMEP)

Konceptuální schéma interakce Foucaultova kyvadla s toroidálním éterovým polem

SEVERNÍ VĚTEV
kladná polarita
($\tau > 0$)

Éterový tok
obíhá ve směru
hodinových
ručiček při pohledu
shora nad severní
polovinou.



JIŽNÍ VĚTEV
záporná polarita
($\tau < 0$)

Éterový tok
obíhá proti směru
hodinových
ručiček při pohledu
shora nad jižní
polovinou.



- r = vzdálenost od severního středu
- R_e = poloměr neutrálního prstence
- a = šířka přechodové zóny

- $\tau(r) > 0$ pro $r < R_e$
- $\tau(r) = 0$ pro $r = R_e$
- $\tau(r) < 0$ pro $r > R_e$

- ▲ Na severu se rovina stáčí jedním směrem
- Na rovníkovém prstenci efekt mizí
- ▼ Na jihu se znaménko obrací

MATEMATICKÝ MODEL

$$\tau(r) = \tanh\left(\frac{R_e - r}{a}\right)$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = \kappa \cdot \Omega_e \cdot \tau(r)$$


kde: α ... úhel precese roviny kmitu

κ ... bezrozměrná vazební konstanta

Ω_e ... efektivní úhlová rychlost éterového víru

$\tau(r)$... toroidální polaritní funkce

PROFIL POLARITNÍ FUNKCE $\tau(r)$



Teorie ploché Země - proč?



Země je kulatá (má tvar rotačního elipsoidu)

Česko



Slovensko



Teorie ploché Země - proč?



Teorie ploché Země - proč?



NEVRATNÁ DESTRUKCE ŽIVÉ PŮDY




PŮDNÍ SKVIHRÁM

Těžká technika a štěrk trvale ničí půdní ekosystém (edafon), kde v jedné hrsti žije více organismů než lidí na planetě.

Biologické dopady na lidské tělo

Aktivace center stresu a strachu:

Snímky mozku potvrzují aktivaci amygdaly při expozici infrazvuku, i když jej člověk vědomě neslyší.



Oslabení srdečního svalu:

Laboratorní testy na živé tkáni prokázaly výrazné snížení síly srdečního stahu po hodinové expozici.



Děkuji za pozornost!

